

Le renouvellement réglementaire du bureau a lieu par l'élection à la présidence de M. le colonel comte Louis de Courten, l'hôte vénérable de l'assemblée, auteur d'un herbier des plantes de Sierre et des environs; sur son refus obstiné, vu son grand âge, M. le docteur Fauconnet de Genève est nommé à l'unanimité à la présidence et M. le professeur Rapin à la vice-présidence. M. de Chastonay, pharmacien à Sierre, est désigné comme secrétaire et M. Taramarcas, pharmacien à Sembrancher, confirmé en sa qualité de caissier.

Morgins a été désigné pour la X^e séance annuelle en 1870.

Description de nouvelles roses, déterminées par Messieurs Puget et Lager, trouvées par M. De la Soie.

Rosa Lusseri, Lager, Puget.

Arbrisseau assez élevé, rameaux verts flexueux, aiguillons dilatés, comprimés à la base, allongés, recourbés; les rameaux florifères quelquefois inermes; pétioles velus, glanduleux, aiguilonnés en-dessous; 5-7 folioles, grandes, ovales-elliptiques ou ovales-aiguës, d'un vert velu en-dessus, très-pâles et pubescentes parsemées en-dessous de petites glandes éparses et brillantes, à côte médiane glanduleuse, doublement dentées, à dents larges, ouvertes, les secondaires terminées par une glande; stipules étroites, glabres en-dessus, un peu velues, glanduleuses en-dessous, à oreillettes aiguës droites ou peu divergentes; pédoncules solitaires ou en corymbe peu fourni, assez longs, hispides, glanduleux, munis à leur base de bractées..... tube du calice ovoïde, lisse ou un peu hispide, glanduleux. Divisions calicinales apendiculées, glanduleuses, plus courtes que la corolle, réfléchies à l'anthèse, non persistantes, styles un peu soudés à la base, glabres, disques saillants, fleur..... fruit obovoïde, petit, lisse ou un peu glanduleux.

Voisin de *R. similata* Pug. dont il diffère par ses folioles beaucoup plus grandes d'un vert clair, à dentelures plus larges et plus ouvertes, moins glanduleuses en-dessous, par son fruit plus petit et plus allongé.

Au Ban de Bovernier, Vallée d'Entremont, Valais.

Rosa Valesiaca, Lag. et Pug.

Arbrisseau peu élevé; tiges florifères toujours inermes; les inférieures portant de rares aiguillons crochus; pétioles canaliculés en-dessus, peu aiguillonnés, parsemés de glandes et de poils qui disparaissent en partie ou totalement avec l'âge; 5-7 folioles grandes, largement ovales-aiguës ou obtuses, glabres et d'un vert sombre en-dessus, flanquées et parsemées en-dessous de rares glandes sur les nervures secondaires; la médiane glanduleuse et portant quelques poils; doublement dentées à dents secondaires, terminées par une glande; stipules glabres, bordées de glandes, les inférieures un peu glanduleuses en-dessous, à oreillettes dressées; pédoncules réunis par trois, rarement solitaires, hispides-glanduleux, munis à leur base de deux bractées opposées, lancéolées, glabres, bordées de glandes et les dépassant; tube du calice ovoïde, contracté au sommet, divisions calicinales ovales-lancéolées, 2 entières, 3 pinnatifides, parsemées de glandes saillantes sur le bouton, plus courtes que la corolle, réfléchies à l'anthèse, non persistantes; styles un peu agglutinés à la base, glabres, disque saillant; fleurs d'un beau rose; fruit petit ovoïde, rétréci et comme étranglé au sommet.

Diffère du *R. nemorivaga* Deseg. par ses rameaux supérieurs inermes, par ses pétioles parsemés de poils dans le jeune âge, par la forme de ses pétioles, par le tube du calice lisse, par ses styles glabres, ses tiges inermes, ses pétioles non velus, ses folioles grandes et glabres à l'exception de la nervure médiane; ses styles, la forme du fruit, l'éloignent entièrement du *R. PUGETI* et du *R. spinosa* Deseg. Haies et bois. Vollèse, Valais. M. De la Soie.

Rosa De la Soieri, Lag. et Pug. — R. De la Soie.

Arbrisseau de 1-2 mètres d'élévation, rameaux florifères aiguillonnés ou inermes, aiguillons crochus, pétioles un peu velus, en-dessus, très-glanduleux, aiguillonnés en-dessous; 5-7 folioles, grandes, largement ovales-aiguës, quelques-unes obtuses, glabres, vertes en-dessus, glauques en-dessous, fermes, nerveuses, doublement dentées, à dents secondaires terminées par une glande,

la côte médiane parsemée de glandes et de petits aiguillons, toutes pétiolées, la terminale arrondie à la base; stipules larges, glabres, parsemées en-dessous et bordées de glandes, à oreillettes droites, pédoncules solitaires ou réunis 2-3, cachés par des bractées glabres, ovales, quelques-unes parsemées de glandes; tube du calice obovoïde lisse, divisions calicinales, 2 entières, 3 pinnatifides, à appendices bordés de glandes, dépassant la corolle, redressés après l'anthèse et couronnant le fruit jusqu'au commencement de la maturité: styles courts, velus, disque peu saillant; fleurs d'un rose vif, fruit obovoïde d'un rouge sanguin à la maturité. Diffère du *R. Acharii* par ses rameaux florifères souvent inermes, par ses folioles ovales-aiguës et non-suborbiculaires, par ses divisions calicinales plus allongées, dépassant la corolle, par ses fleurs plus petites d'un rose vif, par son fruit moins gros, obovoïde et non ellipsoïde: du *R. psilophylla* par ses rameaux inermes, par ses folioles seulement velus en-dessus, par ses folioles non ovales-arrondies, à nervure médiane un peu velue, par ses stipules parsemées de glandes en-dessous, par le tube du calice obovoïde, par ses pédoncules lisses ou quelques-uns portant de rares soies glanduleuses. **Bois-Suisse.** Canton du Valais à Crottaz-Gabioud, vallée d'Entremont. (De la Soie.)

Quelques considérations sur les variétés en botanique.

La variété, (*varietas*, Abart) est une transformation du type spécifique en un individu symétrique mais différant en certaines parties de l'organisme de l'espèce primitive, sans en dénier les caractères primordiaux. (Définition de M. Dœberciner.)

Les variétés peuvent se diverser, quant au caractère qui les fait varier, en cinq groupes.

1^o *Variation de la couleur*; elle se remarque tantôt dans